

Tab. 1 Effetto della copertura sulle caratteristiche qualitative delle ciliegie Black Star e Regina nella stagione 2016.

Copertura	Black Star		Regina		Media delle due cultivar	
	Scoperto	Coperto	Scoperto	Coperto	Scoperto	Coperto
Peso (g/frutto)	11,9 a	11,6 a	12,8 a	12,4 a	12,3 a	12,0 b
Durofel	59,2 a	60,2 a	63,9 a	64,9 a	61,5 a	62,5 a
Durezza (kg)	0,56 a	0,60 a	0,52 a	0,53 a	0,54 b	0,57 a
°Brix	17,8 b	18,5 a	17,4 a	17,0 b	17,6 a	17,7 a
pH	4,62 a	4,62 a	3,83 a	3,89 a	4,23 a	4,25 a
Acidità (g/l ac. Malico)	5,40 a	5,69 a	5,73 a	5,61 a	5,56 a	5,65 a
L	27,2 a	27,1 a	26,2 a	26,4 a	26,7 a	26,8 a
a	12,0 a	12,5 a	10,4 a	11,6 a	11,2 b	12,0 a
b	1,74 a	1,86 a	1,42 a	1,70 a	1,58 a	1,78 a
Chroma	12,2 a	12,7 a	10,5 a	11,7 a	11,3 b	12,2 a

Per ogni riga, differenze significative ($p < 0,05$) sono evidenziate all'interno della stessa cultivar